



Schweizerischer Podologen-Verband SPV

Zentralsekretariat

Bahnhofstrasse 7b

6210 Sursee

Telefon 041 926 07 61

Fax 041 926 07 99

sekretariat@podologie.ch

www.podologie.ch

Groupes à risques

Traitements podologiques des patients présentant un risque spécifique

- Maladies du métabolisme (p. ex. diabète sucré accompagné de polynévrites, sclérodermie, etc.)
- Maladies dans une forme rhumatoïde (polyarthrite chronique, p. ex.)
- Mauvaise circulation sanguine (artérielle et veineuse)
- Patients gériatriques
- Patients atteints de troubles neurologiques (p. ex. polynévrite, paralysie, sclérose en plaques, poliomyélite, etc.)
- Patients sous médicaments (p. ex. médicaments immunodépresseurs, anticoagulants, cortisone)
- Hémopathie (hémophilie) et tendance hémorragique malade (diathèse hémorragique)
- Maladies infectieuses (p. ex. staphylocoques dorés résistant à la pénicilline)

Les patients ne ressentant pas la douleur, la pression, les blessures, le froid et la chaleur, ou les percevant de manière amoindrie ou anormale, risquent de ne pas remarquer les blessures, les inflammations et les infections de leurs pieds. Une défense immunitaire amoindrie suite à une maladie ou à une thérapie, ainsi qu'une mauvaise circulation sanguine, augmentent le risque que les blessures survenues guérissent mal ou qu'elles ne puissent plus l'être, rendant nécessaire l'amputation.

Définition

Personnes présentant un risque accru de mauvaise cicatrisation et/ou d'infection

Causes pathologiques

Lésions artérielles et veineuses

- Oblitération artérielle périphérique dès le deuxième stade
- Insuffisance veineuse chronique (IVC)
- Toutes les maladies du système circulatoire présentant un risque accru de retard de la guérison et d'infections (p. ex. maladie de Buerger, maladie de Raynaud etc.)
- Anticoagulations permanentes ou de longue durée



Schweizerischer Podologen-Verband SPV

Zentralsekretariat

Bahnhofstrasse 7b

6210 Sursee

Telefon 041 926 07 61

Fax 041 926 07 99

sekretariat@podologie.ch

www.podologie.ch

Facteurs neurologiques

- Polynévrite (p. ex. lors de diabète sucré, d'alcoolisme, de polyarthrite, etc.)
- Tétraplégie
- Paraplégie
- Hémiplégie
- Sclérose en plaques
- Etat après une poliomyélite

Maladies affaiblissant l'organisme (risque accru d'infection)

- Néphropathies (p. ex. patients sous dialyse)
- Patients oncologiques
- Maladies virales particulières (p. ex. Sida, hépatite)

Maladies nécessitant la prise de médicaments immunodépresseurs

- Etat après une transplantation d'organe
- Radiothérapie ou chimiothérapie
- Maladies dans une forme rhumatoïde
- Allergies

Patients prenant à long terme des médicaments retardant la cicatrisation

- Cortisone
- Médicaments lors de maladies rhumatoïdes
- Patients sous anticoagulants
- etc.

Pathologies

- Hémopathie (hémophilie) et tendance hémorragique malade (diathèse hémorragique)
- etc.

Cette liste ne prétend pas être exhaustive.